

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
普濟方卷三百三十九

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣黃佑

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十九

明周王朱橚撰

妊娠諸疾門

中風附論

夫四時八方之氣為風也常以冬至之日候之若從其鄉來者長養萬物若不從其鄉來者多為虛邪賊害萬物人體虛則中之若邪風客於皮膚入于經絡即頑痺不仁若入于筋脉挾寒則攣急喎僻挾溫則弛縱若入

臟腑則恍惚驚悸凡五臟俞皆在背臟腑虛風邪皆從
俞而入隨所傷臟腑經絡而為諸病也妊娠中風若不
早治則令墮胎也 夫妊娠體虛受風而傷太陽之經
絡後復遇風寒相搏發則口禁背強名之曰瘖又云瘖
其候昏悶不識人須臾自醒良久復作謂之風瘖亦名
子癰亦名子冒甚則反張葛根湯若有竹近可速辦者
當先作瀝汁次辦湯也其竹遠不可即辦者當先辦湯
此二療會得其一種其竹瀝偏主諸瘖絕起死也非但

偏癱姙娠產婦絕死者有效小兒或癰瘰金瘡發癰瘰
之亦驗

方

赤箭丸

出聖惠方

治姙娠中風手足不遂筋脉緣急言語謇

澁皮膚不仁

赤箭

萆薢

麻黃

去根節

獨活

羚羊角屑

鼠

黏子

熟乾地黄

已上各一兩

防風

去蘆頭

芎藭

當歸

剉微炒

薏以仁

阿膠

搗碎炒令黃燥

五加皮

秦艽

去苗

漢

防已

栢子仁

酸棗仁

丹參

已上各三分

右搗細羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食前以豆淋酒下二十九

烏犀丸

出聖惠方

治妊娠中風口面喎僻言語蹇澁身體強

直或時反張

烏犀角屑

赤箭

麻黃

去根節

酸棗仁

微炒

阿膠

搗碎

炒令黃燥已上各一兩

天南星

炮製

漢防已

各半兩

秦艽

去苗

獨活

羚羊角屑

防風

去蘆頭

白附子

炮製

白殭蠶

微炒

芳

窮

當歸

剉微炒

桑寄生

已上各三分

龍腦

一分研入

右搗細羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵
九如梧桐子大不計時候以薄荷酒下二十九

桑枝煎丸

治妊娠中風手足緩弱口面喎斜言語謇

澹枝節疼痛

桑枝

槐枝

柳枝

已上各一觔細剉

黑豆

一升淘洗過

天蓼朮

半觔挫

已上藥以水二斗煎至五升濾去滓入酒一升更熬

令如稀

天麻

二兩

獨活

海桐皮

萆薢

芎藭

防風

去蘆

頭五加皮

酸棗仁

微炒

薏苡仁

桂心

已上一兩

生

乾地黄

一兩半

右搗細羅為末入煎中去滓更少入煉蜜和搗三

五百杵丸如梧桐子大每服食前以溫酒下二十九

生地黃煎

出聖惠方

治妊娠中風筋脉攣急口眼喎斜皮膚

頑麻言語常澀

生地黃

五觔搗絞取汁

黑豆

一升以水四升煮取一升半去豆

大甜石榴

五顆搗絞取汁

枸杞根

一觔細剉入水中盞搗絞取汁

荆瀝

半升桑根白

皮

一觔細剉入水中盞搗絞取汁

竹瀝

半升

白蜜

五兩

已上諸藥汁相和於銀石鍋中慢火熬如稀餚入後

藥末

羚羊角屑

天門冬

去心焙

天麻

酸棗仁

微炒

當歸

劉微炒

羌活

薏苡仁

蠶沙

微炒已上各一兩

右搗細羅為末研令細入前煎中攪令勻瓷器中盛

每服不計時候以溫酒調下一大匙頭

鐵精丸

出聖惠方

治妊娠中風心神恍惚狂言亂語驚悸煩

亂不得睡臥

鐵精

細研

龍齒

細研

犀角屑

茯神

生乾地黄

已上各一

兩

天竹黃

人參

去蘆頭

遠志

防風

去蘆頭

菖蒲

白鮮皮

已上各三分

麥門冬

一兩半去心焙

金薄

二十一各片研入

銀薄

二十一各片研入 龍腦

半分研入

右搗細羅為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵

九如桐子大每服不計時候以竹葉湯放冷下二十

九

茯神散

出聖惠方

治妊娠中風心神恍惚驚悸胎動不安言

語失次四肢抽掣

茯神

麥門冬

去心

龍齒

石膏

已上一兩

人參

去蘆頭

防風

去蘆頭

生乾地黄

桑寄生

已上各三分

獨活

犀

角屑

鈎藤

白鮮皮

遠志

去心

甘草

已上各半兩

炙微赤剉

右搗篩為散每服四錢以金銀水一中盞煎至六分

去滓不計時候溫服

獨活散 治妊娠因洗頭中風身體強硬牙關緊急失

音不語

獨活

赤箭

麻黃

去根節

阿膠

各一兩搗碎炒黃燥

烏犀角

屑

羌活

防風

去蘆頭

龍腦

一分研入

天蓼木

白附

子

已上各三兩

右搗細羅為散入研了藥令勻每服不計時候以薄

荷湯調下二錢

烏犀角九 治妊娠中風口面喎僻言語謇澁身體拘

急

烏犀角屑

防風

去蘆頭

天蓼木

羌活

獨活

羚羊角屑

赤箭

芎藭

天門冬

去心焙

阿膠

搗碎

炒令黃燥

大麻仁

已上各一兩

麻黃

一兩半去根節

秦艽

去苗

桑寄生

各三分

右搗細羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大

每服食前以薄荷湯下三十九

酸石榴煎出聖惠方治妊娠中風口眼不正言語謇澁手足

不遂

酸石榴

十顆并皮細切研絞更入水一中盞再絞取汁去滓鵝梨十顆搗絞取汁荆

芥

五兩細剉入水一中盞研絞取汁薄荷五兩細剉入水一中盞研絞取汁牛旁

根

半觔淨洗切竹瀝一中盞生地黃汁一中盞白蜜三兩

已上諸藥汁相和於銀石鍋中慢火熬如餠入後藥末

赤箭

二兩獨活 羚羊角屑 防風去蘆頭 桑寄生

阿膠

已上各一兩
搗碎炒令黃燥

右搗細羅為末研令細入前煎中攪令勻瓷器中盛每服不計時候以溫酒調下一大匙頭

葛根湯

一名漢防已湯

療妊娠臨月因發風瘕忽悶憤不識人

吐逆眩倒小醒復發名為子癇

葛根

貝母

去心

牡丹皮

去心

木防已

防風

當歸

川芎

白茯苓

桂心

熱

澤瀉

甘草

各二兩

獨活

石膏

碎

人參

各三兩

右細切以水九升煮取三升分二服貝母令人易產
若未臨月者升麻代之忌海藻松菜酢物若有竹瀝
先作汁次辨湯竹瀝則先服此湯竹瀝偏療諸瘕起
死非但偏治妊娠產婦絕死者小兒或癰瘕金瘡發
瘕治亦効

天麻散

出聖惠方

治妊娠中風牙關緊急身體強直言語不

得痰涎壅滯心胸煩悶

天麻

獨活

麻黃

各一兩
去根節

白殭蠶

微炒

白附子

炮製

羚羊角屑

防風

去蘆頭

阿膠

各三分
碎炒黃燥

半夏

湯洗七遍

去滑生薑

半兩去皮同搗炒令乾

犀角屑

甘草

各半兩炙微赤剉

龍

腦

半分研入

右搗細羅為散入研了藥令勻每服不計時候以竹

漚調下一錢

防風散

出大全良方

治妊娠中風卒倒心神悶亂口禁不能

言四肢強急此藥主之

防風

桑寄生

葛根

各一兩

菊花

防己

北細

辛 秦艽 當歸 桂心 茯神 甘草 羚羊

角屑

各半兩

右為粗末每服四錢水一中盞姜三片煎至六分去

滓入竹瀝半合溫服

麻黃散

一名獨活防風湯出大全良方

治妊娠中風角弓反張口噤語

澁謂之風痙亦名子癇

麻黃

去節

防風

獨活

各一兩

羚羊角屑

桂心

升

麻 酸棗仁

炒

甘草

秦艽

各半兩

川芎

當歸

杏仁

製各三分

右咬咀每服四錢水一盞姜四片煎至六分去滓入

竹瀝半合溫服

羚羊角散

出永類鈴方

治妊娠中風頭項強直筋脉攣急言

語謇澁痰涎不消或發搐不省人事名曰子癇亦宜服之

羚羊角

鎔

川獨活

去蘆

酸棗仁

炒去

五加皮

去木各

半錢

薏苡仁

炒

防風

去蘆

當歸

去蘆酒浸

川芎

茯神

去木

杏仁

去皮尖
各四分

木香

不見火

甘草

炙各二分半

右咬咀每服四錢水一盞生姜五片煎至七分去滓

溫服不計時候

芳藹散 治妊娠中風四肢腰背強直言語謇澁心神

煩悶

芳藹

防風

各一兩
去蘆

犀角屑

葛根

獨活

漢

防己

赤箭

羚羊角屑

甘草

各半兩炙
微赤剉

生乾

地黃

麻黃

去根節

杏仁

各三分湯浸去皮
尖雙人麤炒微黃

右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分煎至六分入竹瀝半合不計時候溫服

羚羊角散 治妊娠中風頭項強直筋脉攣急手足不

隨言語謇澁痰涎不消或時發搐不省人事名曰子

癇

羚羊角屑 獨活 酸棗仁 各一兩 薏苡仁 防風

去蘆頭 五加皮 當歸 剉微炒 芳藟 萆薢 海桐皮

已上各三分 蔓荊子 甘草 各半兩炙微赤剉

右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服一方無甘草

生犀角散 治妊娠中風不語四肢強直心神昏昧宜服

生犀角屑

麻黃

各一兩
去根節

防風

去蘆
頭

赤箭

羌活

當歸

剉微
炒

人參

去蘆
頭

葛根

赤芍藥

已上各
三分

秦

朮

去
苗甘草

各半兩
炙
微赤剉

石膏

右搗篩為散每服四錢水一盞煎至六分去滓入竹

瀝半合不計時候溫服

烏金煎

治妊娠中風語澁頭疼心神煩悶胎動不安

黑豆

一升淘洗令淨

獨活

羚羊角屑

防風

去蘆頭

茯神

牡荊子

牛旁根

桑椹

桑寄生

薄荷

荊芥

已上各一兩

生乾地黄

右搗篩以水一斗五升煎至五升去滓入白蜜三兩

竹瀝半升更熬令如稠錫瓷器中盛每服不計時候

以金銀溫湯調下一大匙頭

獨活散 治妊娠中風腰背強直或時反張名為風痙

獨活

防風

去蘆頭

赤箭

麻黃

各一兩去根節

葛根

剉芎

翳

秦艽

去苗

五加皮

甘草

各半兩炙微赤剉

羚羊角屑

當歸

酸棗仁

各三分微炒

右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分煎至六

分去滓不計時候溫服

天麻散

治妊娠中風痙身體強直或時反張口噤失

音

天麻

一兩

天南星

炮製

獨活

防風

去蘆頭

芳藟

酸棗

仁

微炒

白附子

炮製

羚羊角屑

各半兩

犀角屑

阿膠

搗碎

炒令

黃燥

麻黃

各三分
去根節

龍腦

一分
研入

右搗細羅為散入研了藥令勻每服不計時候以竹

漚調下一錢

木防已散

治妊娠中風口眼不正手足頑痺

防風

羌活

防已

各一兩

麻黃

半兩
去節

桂心

半兩

黃松

木節

一兩

荊芥穗

羚羊角屑

甘草

桑寄生

薏苡仁

各半兩

右咬咀每服三錢水一盞生薑半分煎至七分去滓

溫服

防風散

治妊娠中風腰背強直時復反張名為風痙

防風

葛根

川芎

生乾地黄

各三兩

杏仁製麻

黃

去節各一兩半

桂心

獨活

甘草

防己

各一兩

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服

白姜蠶散

治妊娠中風口噤心膈痰涎壅滯言語不

得四肢強直

白殭蠶

微炒

天麻

獨活

各一兩

烏犀角屑

三分

白附子

炮製

半夏

湯洗十遍去滑以生姜半兩去皮同搗爛焙乾

藿香

龍腦

一錢研入

天南星

各半兩炮製

麻黃

一兩半去根節

右搗細羅為散入研了藥令勻每服不計時候以生

姜薄荷湯調下一錢

羌活散 治妊娠中風痙口噤憤悶不能言身體強直

或時反張

羌活

防風

去蘆頭

芎藭

葛根

劉

秦艽

各三分去苗

麻

黃

三兩去根節

杏仁

一兩半湯浸去皮尖雙人麴炒微黃

犀角屑

甘草

各半兩炙微赤剉

右搗粗羅為散每服四錢水一盞入生姜半分煎至

六分去滓不計時候溫服

梨汁飲子

治妊娠中風失音不語心神胃悶

梨汁

合二竹瀝

合二生地黃汁

合二牛乳

合一白蜜

合半

右件藥相和令勻每服飲一小盞

荊瀝飲子 治妊娠中風語澁舌不轉心煩悶

荊瀝

合二

生葛根汁

合二

竹瀝

合三

白蜜

合半

右件藥相和令勻煎一沸每服溫飲一小盞

獨活飲子 治妊娠中風口面喎斜語澁舌不轉

獨活

判一兩

竹瀝

合二

生地黄汁

合二

右件藥先以水一大盞煎獨活至六分去滓下竹瀝
地黄汁攪勻更煎一沸分溫二服

阿膠飲子 治妊娠中風語澁心煩項強背拘急眼澁

頭疼昏昏多睡

阿膠

半兩搗碎
炒令黃燥

竹瀝

五合

荆瀝

三合

右件藥相和令勻每服溫飲一小盞

荆瀝飲子

治妊娠中風瘧口噤

荆瀝

三合

竹瀝

五合

梨汁

三合

右件藥相和令勻分溫兩度灌之

竹瀝飲子

治妊娠中風瘧口噤煩悶

竹瀝

五合

人參

二合

陳醬汁

半合

右件藥相和溫分二服拗開口灌之

白朮酒 治妊娠中風口噤語言不得

白朮

一兩半

獨活

一兩

黑豆

一合炒

右細剉以酒三升煎取一升半去滓溫分四服口噤者拗開灌之得汗即愈一方無黑豆亦治通身冷直一方有防風

防風湯 治妊娠中風口噤四肢強直反張一名羗活

酒

防風

五錢
羌活 一錢
分半

右為細末以黑豆一合炒焦火煙出投無灰酒候沸
定以酒調藥斡開口灌下稍甦再灌却與治剛柔二
瘕藥速救省人事

治妊娠因感外風如中風狀不省人

急用熟艾三兩以米醋炒令極熱乘熱以絹帛裹熨
向臍下良久開省

治妊娠中風寒熱腹中絞痛不可針灸方亦療妊娠時

行傷寒

急用鯽魚一頭燒作灰搗末酒服方寸匕取汗一方
有用乾魚一枚燒灰酒服不用鯽魚

作竹瀝法

右取新伐青淡竹斷之除兩頭節留中央一節作片
以塼並側令竹兩頭虛布列其上燒中央兩頭汁出
以器承之取服

治妊娠忽如中風心前昏悶却如有一塊物上塞咽喉

便昏迷不識人事宜服此方大腑虛冷喫食減少即不宜服

麥門冬

去心

防風

沉香

藿香

桑寄生

川芎

各一分半夏二銖

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎取九分空心和

滓喫

枳殼散 治孕婦不省人事謂之子癰

用滑胎枳殼散生藕汁調下無藕則用蘿蔔生姜

汁亦可

治妊娠五心煩躁五臟傷熱忽時嘔逆惡心飲食減少
或非時中風頭旋目暈悶倒不識人事大腑祕熱方

防風 山梔 鈎藤 人參 桔梗 升麻 大

黃各一分桑寄生半兩

右細搗羅為末每服三錢水一盞煎取兩三沸食後

去滓服

傷寒 附論

夫冬時嚴寒人體虛為寒所傷即成病為傷寒輕者浙
浙惡寒翕翕發熱微咳鼻塞數日乃止重者頭疼體痛
先寒後熱久而不愈則傷胎凡妊婦傷寒仲景無治法
用藥宜有禁忌不可與尋常婦人一槩治之也 妊娠

外感風寒渾身壯熱眼暈頭旋者何蓋因風寒客於皮
膚傷於榮衛或洗項背或當風取涼致令頭目昏痛增
寒發熱甚至心腦煩悶大抵產前二命所係不可輕易
妄投湯劑感之初止宜進芳藶散以發散表邪其病自

愈

方

前胡散 治妊娠三兩月傷寒頭痛煩熱嘔噦胎氣不

安

前胡

去蘆頭

阿膠

搗碎炒令黃燥

麥門冬

去心

人參

各一兩去蘆

赤

茯苓

白朮

各一兩半

當歸

剉微炒

芳薊

各三分

甘草

半兩炙微

赤
剉

右搗羅為散每服三錢水一盞入生姜半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候溫服

丹參散 治妊娠三兩月傷寒頭痛壯熱嘔逆

丹參

當歸

剉微炒

人參

去蘆頭

麻黃

去根節

艾葉

微炒

阿

膠

搗碎炒黃燥

甘草

炙微赤剉已上各半兩

右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分棗二枚煎至六分去滓不計時候溫服

麥門冬湯 治妊娠三兩月傷寒壯熱嘔逆頭疼不思

飲食胎氣不安一名人參散

人參

石膏

各一兩

前胡

黃芩

各三分

家葛根

麦

門冬

各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半生姜四片棗二枚淡竹

茹一分煎至八分去滓溫服

麦門冬散 治妊娠三四月傷寒頭痛壯熱吐逆不思

飲食

麦門冬

一兩去心

半夏

湯洗七次去滑

麻黃

去根節

阿膠

搗碎炒黃燥

人參

各三分去蘆

甘菊花

一分

當歸

剉微炒

甘草

各半兩炙微赤剉

右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

大腹皮散 治妊娠四月傷寒胃中有冷心中欲嘔胃膈煩悶不思飲食時有虛熱或小便如淋臍下急滿或頸項強痛有時胎上迫心心中煩悶

大腹皮

剉

前胡

去蘆頭

雞蘇莖葉

枳實

麩炒微黃

白朮

桑根白皮

剉

茯神

各三分

木香

赤芍藥

續斷

甘草

各半兩炙微赤剉

厚朴

一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

半夏散 治妊娠四五月傷寒壯熱頭痛心胃煩悶嘔吐痰涎不思飲食

半夏湯浸七次去滑當歸剉人參去蘆頭麻黃去根節麥門冬

去心黃耆各三分剉旋復花半兩甘草一分炙阿膠一兩搗碎炒黃
燥

右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分煎至六

分去滓不計時候溫服

芍藥湯 治妊娠傷寒五月已前當用此藥一名當歸散

黃芩

當歸

芍藥

各四錢

白朮

八錢

川芎

一兩六錢

右搗細末溫酒調服方寸匕日二服產後百病悉皆主之常服則易產無疾苦

麻黃散 治妊娠五六月傷寒頭痛壯熱四肢煩痛或

口乾心躁

麻黃

桂心

柴胡

赤芍藥

各一兩

甘草

半兩

右咬咀每服三錢水一盞姜三片煎至六分去滓無時溫服一方石膏二兩鄭氏加葛根一兩去桂心

杏仁散 治妊娠六月傷寒頭痛壯熱咳嗽氣急

杏仁

湯浸去皮尖雙人麴炒微黃

五味子

各三分

甘草

炙微赤剉

乾姜

炮製

紫苑

各半兩洗去苗土

麥門冬

一兩去心

鍾乳粉

半分

右搗粗羅為散每服三錢水一盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

通表散 治妊娠五月六月或七月卒患傷寒煩熱四

體疼痛不得安臥宜服

麻黃

一兩半
去根節

赤芍藥

一兩

甘草

半兩炙
微赤剉

右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠六七月傷寒熱入腹大小便秘結不通蒸熱

前胡

錢一

大黃

石膏

各二錢

梔子仁

十枚

知母

黃芩

茯苓

生姜

各八分

右水八升煎取二升半後下大黃更煎三五沸分作

三服

葱白飲

治婦人妊娠七月若傷寒壯熱赤斑變為黑

斑溺血

方見時氣門瘴疫類葱白湯

治妊娠七月若傷寒壯熱赤斑變為黑斑溺血

用艾葉如鷄子大酒三升煮取一升半分為二服

百合散

治妊娠七八月傷寒煩熱喘咳不欲飲食

百合

桔梗

去蘆頭

貝母

煨微黃

赤芍藥

紫苑

洗去苗

桑根白皮

剉

前胡

去蘆頭

赤茯苓

已上各一兩

甘草

三分炙微

赤
劉

右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫一服熱一服必愈

柴胡散 治妊娠七八月傷寒頭痛壯熱心腹虛脹四

肢少力

柴胡 續斷 白朮 赤芍藥 厚朴 各一兩去粗皮塗生

姜汁炙 枳殼 三分去穰 芎藭 三分 當歸 剉微炒 甘草 各半

兩炙微
赤劉

右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

芍藥飲 治妊娠七八月暴傷風寒身體煩疲寒熱往來胎動不安頭目昏眩腰背痠痛

芍藥 當歸 切焙 白朮 甘草 炙判 人參 厚朴 去粗皮生

姜汁炙
各一兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半生姜三片薤白三寸同煎至八分去滓溫服不拘時

蘆根散 治妊娠七八月傷寒煩熱心胃妨悶咳嗽嘔逆不下飲食

蘆根

剉

前胡

湯洗去頭

陳橘皮

湯洗去白穰焙

赤茯苓

各一兩

半

夏

三分湯洗七次去滑

甘草

半兩炙微赤剉

右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

赤芍藥散 治妊娠八月傷寒頭痛壯熱小便赤黃心腹氣脹不思食

赤芍藥 白朮 前胡 赤茯苓 枳壳

去蘆頭

各一兩

炒散黃 當歸 剉微炒 甘草 炙微赤剉 厚朴 各半兩去粗皮塗生薑汁炙令

香 人參 三分去蘆頭

右搗篩為散每服四錢水一盞入生薑半分葱白五

寸煎至六分去滓不計時候溫服

芩藟散 治妊娠九月傷寒頭痛壯熱心中煩悶小腹

冷疼

芩藟 當歸 剉微炒 赤芍藥 各三分 白朮 一兩 吳茱萸 湯浸

十次 甘草 各一分炙 前胡 一兩去蘆頭 阿膠 搗碎炒半

夏 湯洗七次去滑 枳實 各半兩麩炒微黃

右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候溫服

阿膠散 治妊娠九月傷寒煩熱或覺胎不穩腹滿懸

急腰疼不可轉側

阿膠 搗碎炒 陳橘皮 湯浸去白皮槩焙 半夏 湯洗七次去滑 芎藭

當歸 各半兩剉微炒 白朮 赤芍藥 麥門冬 各三分去心

右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

石膏散

出聖惠方

治妊娠十月傷寒頭痛壯熱咳嗽煩悶

石膏

二兩

人參

去蘆頭

麥門冬

去心

杏仁

湯浸去皮尖雙人麴炒微黃

柴胡

去苗

赤芍藥

各一兩

細辛

甘草

各半兩炙微赤剉

葵子

三分

右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

赤茯苓散

出聖惠方

治妊娠十月傷寒煩熱吐逆不欲飲食

赤茯苓

白朮

麥門冬

去心

人參

去蘆頭

黃耆

剉已上各

一兩半夏

半兩湯洗七次去滑

右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

阿膠湯

出聖惠方

治妊娠傷寒安胎出汗夫妊娠感冒寒邪

藏于皮膚洒然而寒燿然而熱頭項痛腰脊強脉浮在表者當汗之在裏者下之汗下之理制方宜輕但非

破血傷胎之劑皆通用之和其陰陽正其表裏使經
不傳邪無深入斯無危殆矣

阿膠

炒令燥一分

獨頭蒜

一顆以秋收瓜蔓裹了外用黃泥固濟定以末無炭灰二

筋燒令通赤放冷打開取出細羌活去蘆頭獨活去蘆

頭蒼朮

米湯浸一宿去粗皮焙

紫苑

去土

白朮

人參

附子

炮製去皮臍各一分甘草半分炙

右剉搗如麻豆每服三錢匕水一盞入連須葱白一
寸同煎至七分去滓溫服如人行十里許連服二服

至三服末後一服喫了便以冷水漱一漱一二十徧
漱罷以衣微蓋取汗

前胡散 治妊娠傷寒頭痛身體煩熱胃脇氣滯嘔逆
不止

前胡

去蘆頭

子芩

貝母

煨微黃

麥門冬

去心

人參

去蘆頭

赤茯苓

已上各一兩

半夏

湯洗七次去滑

木香

甘草

各半兩炙微赤

剉

陳橘皮

一兩湯浸去白穢焙

右搗篩為散每服三錢水一盞入生姜半分煎至六

分去滓不計時候溫服

旋覆花湯 治妊娠傷寒頭目旋痛壯熱心燥

旋覆花

赤芍藥

甘草

各半兩

前胡

石膏

各一兩

白朮

人參

麻黃

去根節

黃芩

各三分

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑半分煎至六分去滓無時溫服一名前胡散

白朮散 治妊娠傷寒煩熱頭痛胎氣不安或時吐逆

不下食

白朮 橘紅 麥門冬 人參 前胡 赤茯苓

川芎

各一兩

甘草

半夏

各半兩

右咬咀每服四錢水一中盞姜四片淡竹茹一分煎至六分去滓無時溫服

芎藭湯 治妊娠傷寒增寒壯熱頭痛體疼

芎藭

去苗

白朮

各一兩米泔浸半日炒

芎藭

當歸

焙乾

芍藥

防風

去蘆

赤茯苓

去黑皮各一分

黃耆

細剉

生乾地黄

焙各半兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞棗三枚劈破生姜三

片煎至六分去滓不計時候溫服

治孕婦傷寒一名柴胡散

柴胡 前胡 川芎 當歸 人參 芍藥 粉

草 生地黃

各等分

右為細末每服二錢姜三片棗四枚煎至七分去滓
溫服要汗加葱

升麻散 治妊娠傷寒百節疼壯熱不急治即胎落

柴胡

一兩去蘆

乾葛

半兩

知母

半兩

石膏

一兩

大青

六錢

梔子仁

一升麻八錢葱白切半

右水七盞煎至三盞分三四服一方加甘草一分

大安散

出永類
鈴方

治妊娠傷寒渾身壯熱眼暈頭旋此蓋

因傷寒氣客於皮膚傷於榮衛或洗項背或當風取
涼致令心胃煩悶增寒發熱時發狂躁急先以大安
散解其表次調其裏令血氣調勻其病自愈

麻黃

去節
一錢

乾姜

一錢
炮

石膏

二錢
炒

山茵陳

一錢

京窮

半錢

白朮

半錢

甘草

一錢
炙

人參

七錢
七分

右剉作三服水一盞半葱白三寸煎一盞通口服一
方用乾葛

參蘇飲 治外感風寒渾身壯熱眼昏頭旋或洗項背
或當風取涼致令頭目昏痛增寒壯熱心胃煩悶妊
娠不可輕易投劑止宜用此以散表邪及治痰飲嘈
煩忪悸嘔逆不食胸滿此藥至和而平吐嘔加白朮
腹脹枳實虛煩竹葉煩躁大渴麥門冬知母水停心
下微吐逆茯苓頭痛川芎腹痛加白芍藥

方見婦人
科傷寒類

香蘇散

出危氏方

治妊娠增寒壯熱頭痛身疼加川芎川白

芷生姜蔥白煎得微汗解

方見婦人科傷寒疫癘類

竹茹湯

治妊娠嘔頭痛寒熱往來五心煩悶四肢不

和

人參

陳皮

去白

白朮

麥門冬

去心各五錢

甘草

二錢半

厚朴

去粗皮切姜炒

茯苓

竹茹

各五錢

右剉散每服三錢水一盞生姜三片煎不以時服

前胡湯

治妊娠傷寒頭疼惡寒渾身壯熱

前胡

去蘆頭

升麻

麻黃

先煎掠去沫焙

人參

羚羊角

鎊

白朮

各一兩

陳橘皮

去白炒三分

甘草

一分

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入葱白一寸生姜三

片煎至七分去滓稍熱服不計時候

芳蘇散

治妊娠外感風寒渾身壯熱眼昏頭旋心胃

煩悶此藥以發散表邪其病自安

紫蘇葉

川芎

白芍藥

白朮

麥門冬

去心陳

皮

葛根

各一兩

甘草

半兩

右為粗末每服四錢水一盞半生姜五片葱白三寸煎至八分去滓溫服不拘時

柴胡散 治妊娠傷寒身體重發熱惡寒肢節煩疼微吐心下脹滿外證未去

柴胡

一兩
去苗

黃芩

人參

去蘆
頭

赤芍藥

甘草

炙微
赤剉

犀角屑

半夏

湯洗七
次去滑

麥門冬

去心各
半兩

右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

麻黃散

出聖惠方

治妊娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼

麻黃

去根節

前胡

去蘆頭

赤芍藥

人參

去蘆頭

知母

黃芩

桔梗

已上各一兩去蘆頭

石膏

二兩

右搗篩為散每服四錢水一盞入葱白五寸生姜半

分棗三枚煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼名前胡七物湯

出大全良方

石膏

大青

黃芩

各三兩

葱白

切一升

前胡

知母

梔子仁

各四兩

右咬咀以水七升煮取二升半去滓分五服相去如人行七八里久再服一方加甜竹茹三分

升麻散

出聖惠方

治妊娠傷寒頭疼身體壯熱四肢不利

川升麻

蒼朮

麥門冬

麻黃

各一兩

黃芩 大

青

各半兩

石膏

二兩

右咬咀每服四錢水一盞姜半分淡竹葉二七片煎至六分去滓無時溫服

治妊娠傷寒頭疼腹痛

出大全良方

升麻

黃芩

各六分

家葛根

大青

石膏

甘草

各三分

苦竹葉

一握並細剉

右用水一升半先煮苦竹葉乾葛減半入諸藥再煮

至六合去滓溫服

治妊娠傷寒骨節疼痛壯熱不急治則胎落

出大全良方

葱白

切一升

前胡

家葛根

石膏

各一錢

青黛

六分

升

麻

八分

梔子仁

十二分

右咬咀以水七升煮取二升半去滓分溫三服

治妊娠傷寒苦熱不止身上斑出忽赤黑小便如血氣
欲絕胎欲落

梔子仁

升麻

各四兩

青黛

一兩

石膏

八分

葱白

切一升

黃

芩

三兩

生地黃

一錢二分

右咬咀以水九升煎取三升去滓作三服忌熱物

蘇木湯 治妊娠傷寒或中時行洒淅作寒振慄而悸

或加噦者

赤芍藥

橘紅

黃芩

黃連

甘草

蘇木

等各

分

右咬咀每服五錢水一盞煎至六分去滓溫服汗出
瘥若胎不安兼服阿膠湯

阿膠湯 治妊娠傷寒瘟疫時氣先服此以安胎却以

治病藥相間服

阿膠

炙

白朮

桑寄生

人參

白茯苓

各等分

右為細末煮糯米飲調服方寸匕日三服

當歸茯苓散

一名當歸芍藥散

治婦人傷寒腹中隱痛

方見心腹疼痛類

白朮湯 治妊娠傷寒壯熱增寒頭疼體痛

白朮

石膏

葛根

剉

何首烏

甘草

炙各一兩

麻黃

去節洗煎掠
去沫焙三兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入葱白一寸煎取七分去滓溫服不計時候

犀角散 治妊娠傷寒壯熱頭疼煩悶

犀角屑

梔子仁

甘草

各半兩炙微赤剉

柴胡

去苗

薺苳

石膏

各一兩

右搗篩為散每服四錢水一盞入淡竹茹一分煎至六分去滓不計時候溫服

細辛散 治妊娠傷寒心胃不利壯熱頭痛

細辛

訶梨勒皮

各三兩

前胡

去蘆頭

烏梅肉

各一兩微炒

白朮

二兩甘草

半兩炙微赤剉

右搗篩為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓不計時候溫服

柴胡散 治妊娠傷寒壯熱心煩頭痛

柴胡

去蘆頭

黃芩

阿膠

各二兩搗碎炒黃燥

石膏

二兩

麥門冬

三兩

甘草

半兩炙微赤判

右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候溫服

芍藥湯

出醫方大成

治婦人妊娠傷寒自利腹中痛飲食不

下脉沉者太陰也

芍藥

白朮

各一兩

甘草

茯苓

各五錢

黃耆

三兩

右咬咀以水一升煎熱服若妊娠傷寒藥性須涼慎

不可用桂枝半夏桃仁等藥小柴胡去半夏名黃龍
湯蓋為妊娠而去也大抵產前先安胎產後先補益
次服傷寒藥若病少退則此藥不可盡劑此為大法
黃帝問婦人重身毒之柰何岐伯曰有故無殞亦無
損也大積大聚其可犯乎衰其大半而已

麻黃湯 治妊娠傷寒發熱惡寒身體疼痛

麻黃

去節先煎
掠去沫焙

蒼朮

各三兩

白朮

甘草

炙各一兩

陳橘

皮

去白炒
二兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入葱白一寸鹽豉七粒煎至七分去滓溫服不計時候

前胡湯 治妊娠傷寒頭疼壯熱

前胡

去蘆頭

白朮

人參

去蘆頭

黃芩

去黑心

石膏

碎各二兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入葱白一寸煎至六分去滓溫服空心食前

金花散

出聖惠方

治妊娠傷寒加腹脹大便不通喘急

川大黃

剉碎微炒

鬱金

青橘皮

各一兩湯浸去白穰焙

牽牛子

二兩
微炒甘草二分炙

微炒

右搗細羅為散每服不計時候以生姜湯調下二錢

以利便差

治妊娠頭疼壯熱心煩嘔吐不下食名蘆根湯

出千金方

知母 粳米五合 生蘆根

一升 青竹茹三兩

右以水五升煮取二升半稍稍飲之盡更作差止

療妊娠傷寒涎多咳嗽

出大全良方

知母 杏仁 天門冬 桑白皮

各等分

右吹咀每服三錢水一盞煎至七分去滓服

前胡湯 治妊娠傷寒頭痛壯熱

前胡

去蘆頭

黃芩

去黑心

石膏

碎

阿膠

炙燥各一兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不計時溫服

黃龍湯 治妊婦寒熱頭疼嘿嘿不欲食脇下痛嘔逆痰氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞復餘熱不解一名小柴胡湯

柴胡

去蘆 一兩

黃芩

人參

甘草

各一分半

右以咀每服五錢水一盞半煎至一中盞去滓溫服

治妊娠傷寒服湯後頭痛壯熱不歇宜用此湯拭其身

麻黃

半

竹葉

切一升

石膏

三升 為末

右以水五升煮取一升去滓冷用拭身體又以故布

揔頭額胃心燥則易之患瘡者加恒山五兩

枳實散

治妊婦傷寒四日至六日以來加心腹脹上

氣渴不止飲食不下腰疼體重

枳實

炒 一兩

陳皮

三兩

麥門冬

半兩

右為細末每服三錢水一中盞生姜半分葱白七寸

煎至六分去滓溫服

治妊娠傷寒中風表虛自汗頭痛項強身熱惡寒脉浮而弱太陽經病宜表虛六合湯

四物湯

四兩

麻黃

細辛

各半兩

治妊娠傷寒頭痛身熱無汗脉浮緊太陽經宜表實六

合湯

四物湯

四兩

防風

蒼朮

製各七錢

治妊娠傷寒過經不愈溫毒發斑如錦文宜升麻六合

湯

四物湯

四兩

升麻

連翹

各七錢

治妊娠傷寒汗下後咳嗽不止者宜人參六合湯

四物湯

四兩

人參

五味子

各五錢

治妊娠傷寒汗下虛痞脹滿者陽明本虛也宜厚朴六

合湯

四物湯

四兩厚朴

枳實

麩炒各五錢

治妊娠傷寒壯熱心煩頭痛

葱白

五莖

生姜

半兩細切

青竹茹

二兩

右以水一大盞半煎取一盞去滓不計時候分溫三

服

厚朴散

治妊娠傷寒頭痛身體煩熱

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙香熱

甘草

各三兩炙微赤剉

皂莢

一分去皮塗酥炙令

熱黃
去子

右搗細羅為散每服不計時候點好茶調下一錢

治妊娠傷寒渾身壯熱嘔逆頭痛足酸心腹刺痛發熱

當發汗

葱白

十
莖生姜 三
兩

右以水三升煮取一升半頓服取汗

白朮散 治妊娠傷寒安胎

白朮

黃芩

新瓦上炒令
香各等分

右治散每服三錢水一中盞姜三片棗二枚煎至七

分溫服但覺頭痛發熱便可喫二三服即差惟四肢厥冷陰證者未可服此方治疾無有不效者仍安胎

盆母子

傷寒安胎

白朮

黃耆

各等分新瓦上炒令香

右末三錢水一盞姜三片棗二枚煎七分

單胎散 治傷寒大熱悶亂燥渴恐傷胎

嫩卷荷葉

焙乾
一兩蜂粉半兩

右為末每服二錢蜜少許新汲水調下食前研家園
生葛汁服亦安

治妊娠遭時疾令子不落

取竈中黃土水和塗臍乾復塗之一方酒和塗之
又方泔清和塗之並佳

又方

取犬尿泥塗腹勿令乾

療妊娠傷寒

以鯉魚一頭燒末酒服方寸匕令汗出兼治乳無

汗

又云
鯽魚

治雙身婦人傷寒時行溫疫頭痛身熱

用升麻散一兩水半碗大作劑料去滓分作二服
先一服吐下後一服勿吐次以長流水加生姜棗
煎五苓散熱啜之汗盡頭痛立止

護胎白子散 治妊娠傷寒

用白藥子不拘多少為末用鷄子清調塗在紙上

紙可碗口大貼之臍下胎存處乾即以溫水潤之
治妊娠傷寒身體壯熱增寒嘔逆四肢微冷頭痛脚疼
心腹有氣至三日內未差者宜服此方

右取生姜一分研濕紙裹燒熟酒調下後喫粥飲
投之汗出為效

治婦人妊娠傷寒畜血

出拔
萃方

詩云 婦人妊娠或畜血 抵當桃仁勿妄施

要教子母俱無損 大黃四物對服之

治婦人傷寒妊娠服藥例

出拔
萃方

若發熱惡寒不離桂枝芍藥若往來寒熱者不離柴
胡前胡若火渴者不離知母石膏五味子麥門冬若
大便泄者不離桂附白朮乾姜若大便燥結者不離
大黃黃芩若經水適來適未斷者不離小柴胡若安
胎者不離人參阿膠白朮黃芩若發汗者不離蔥豉
生薑麻黃旋覆若頭痛者不離前胡石膏梔子若傷
暑頭痛者不離前胡石膏甘草若滿悶者不離枳實

陳皮若胎不安者不離黃芩麥門冬人參若斑黑者
不離黃芩梔子升麻

梔子大清湯 療妊娠婦人七月傷寒壯熱赤斑變為
黑斑溺血

升麻 梔子 大青 杏仁 黃芩 各三兩 蔥白 一切

升

右六味切以水六升煮取半分三服

梔子五物散 廣濟療妊娠傷寒頭痛壯熱

梔子 前胡

知母

各三兩

黃芩

一兩

白石膏

四兩

右剉如麻豆大每服五錢水一小盞半煎至一盞溫

服

治妊娠後忽傷寒頭痛壯熱渾身百節俱痛心中煩躁方

石膏 山梔

知母

黃芩

桔梗

杏仁

前

胡 葛根

升麻

各五錢

大黃

炮一分

右細杵羅為末每服三錢或四錢以水一盞一分生

姜三片葱白三枝同煎取九分食後臨臥時徐徐去

滓服病效即住

治妊娠後頭痛傷寒大小腑祕熱身上發斑心中煩躁

昏悶不安

黃芩 大黃 山梔 升麻 防風 麥門冬

前胡 杏仁 桔梗 郁李仁 獨活 大青

各等

分

右細杵羅為末每服三錢水一盞二分煎取一盞食

後去滓服

黃耆解肌散 治婦人妊娠傷風自汗

人參 黃耆 當歸 川芎 炙甘草 芍藥

各五分

加蒼朮生地黃亦可

右為粗末每服五錢水煎溫服無時

治妊娠大腑寒溫不等或祕或瀉腹中氣滯飲食加少
心頭妨滿兩脇脹逆四體不安

桑寄生 黃橘皮 大腹皮 枳殼青 人參

桔梗 剝木 川芎 藿香

各一分 三錢

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎取一分食後去滓服

妊娠傷寒仲景無治法用藥宜有避忌不可與尋常婦

人一槩治之也類證活人詩云因熱生風以四物湯加

川芎一分柴胡半兩身熱麻躁頭昏項強加柴胡黃芩各二兩

祕澁加大黃半兩桃仁一分滑瀉加桂附各一分發寒熱加

乾姜牡丹皮芍藥各一分煩燥大渴加知母石膏各半兩嘔

加白朮人參各半兩腹脹加厚朴枳實各一分虛煩不得眠

加竹葉人參

各一分

水停心下微吐逆加猪苓防己


各一分

虛寒壯熱類傷寒加人參柴胡防風

各三分

其說如此更

宜審詳如附子肉桂大黃桃仁尤不可輕用



普濟方卷三百三十九

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百四十一

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣黃佑

欽定四庫全書

普濟方卷三百四十

明 周王朱橚 撰

妊娠諸疾門

熱病 附論

夫冬時嚴寒觸冒傷之藏于肌骨夏至乃發壯熱又為暑病即熱病也此寒氣蘊積發即為病若妊娠遇之多致墮胎非節之氣傷於妊婦熱毒之氣侵損胞胎遂有墮胎漏氣俱害子母之命也

方

催生湯 妊娠熱病六七日極熱損胎或兒死身冷不能自出須用暖胎藥用黑神散不若用催生湯

蒼朮 桔梗 橘紅 白芷 桂心 粉草 當歸 乾姜 製朴 芍藥 半夏 川芎 枳殼

各四兩
南木香 真杏仁

右每服三錢水一盞半姜棗煎大半盞服

柴胡散 治妊娠熱病骨節煩痛頭疼壯熱若不止則

損胎

柴胡 家葛根 知母 梔子仁 甘草

各半兩

石

膏 大青 黃芩 升麻

各三兩

右咬咀每服四錢水一盞葱白三寸煎至六分去滓不拘時溫服

人參散 治妊娠熱氣乘于心脾津液枯少煩躁壅熱口舌乾渴

人參 麥門冬 赤茯苓 地骨皮 家葛根

黃芩

犀角屑

各三兩

甘草

半兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

人參黃耆散

治妊娠身熱煩躁口乾食少

人參

黃耆

家葛根

秦艽

麥門冬

各二兩

知

母

二分

甘草

半兩

赤茯苓

一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜三片淡竹葉十四片煎

至六分去滓溫服

大黃飲子

治妊娠熱病六七日熱入腹中大小便秘

澁煩熱

川大黃 石膏 知母 前胡 赤茯苓

各三分

梔

子仁 甘草 黃芩

各七兩

右咬咀每服半兩水一大盞生地黃一分煎至六分

去滓無時溫服

黑神散

一名烏金散
一名肉桂散

治熱病胎死腹中此病因母患熱

病至六七日以後臟腑極熱熏煮其胎是以致死緣

兒死身冷不能自出但服黑神散暖其胎須臾胎即

自出何以知其胎之已死但看產母舌青者是其候也及治敗血不散乍寒乍熱

桂心 當歸 芍藥 甘草 乾姜 生乾地黄

各一兩 黑豆 炒去皮 附子 半兩

右為細末每服二錢空心溫酒調下一方無附子用蒲黃 夫妊娠謂之重身二命係焉將理失宜皆能損胎或熱病熏蒸所致或因預仆驚恐出入觸及素有癥瘕積聚壞胎最多候其舌青即知子死養胎

論曰面青舌赤母死子生唇青吐涎子母俱斃又有
雙懷二胎或一死一活其候尤難知非臨時審視未
易預逆不可不備學也然以黑神散溫胎不若補助
產母使其氣正免致虛虛之困頓胎自下矣催生湯
殊勝黑神散

葛根散 治妊娠數月胃膈煩躁唇口乾渴四肢壯熱
少食

葛根 黃芩 人參 姜糖 黃耆 麥門冬

甘草

各等分

右咬咀每服四錢水一盞竹茹一塊如錢大煎至七

分去滓溫服無時

知母散 治妊娠煩躁悶亂口乾及胎臟熱

知母 麥門冬 甘草 各半兩 黃芩 子芩 赤茯苓

苓

各三分

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓入竹瀝一

合更煎二沸溫服一方用竹茹一塊無竹瀝

人參飲子 治妊娠熱病壯熱頭痛嘔吐不止不食心
胃煩悶經云熱病與中暑相似但熱病者脉盛中暑
者脉虛

人參 竹茹 家葛根 各一兩
兩 蘆根 二兩
兩 麥門冬 一兩
半

知母 三
分

右咬咀每服四錢水一盞入連根葱白三寸煎至七
分去滓溫服

梔子仁飲子 治妊娠熱病斑出黑色小便如血氣急

欲絕胎欲落

梔子仁 升麻

石膏

生乾地黄

各二兩

黃芩

大青

各二兩

右咬咀每服半兩葱白七寸豉四十九粒水一盞煎至五分去滓溫服救急有杏仁無地黃石膏一方加青黛無大青又方以陳皮如雞子大酒煮服

治妊娠熱病六七日熱入腹大小便秘澀煩熱

右以牛糞中水調塗腹上勿令乾

縮脾飲

解伏熱除煩渴消暑毒止吐痢霍亂之後服

熱藥太多致煩躁者宜沉冷水冷頓服

草薹仁

四兩

烏梅肉

三兩

甘草

二兩半

右咬咀每服半兩水一碗生姜十片煎至八分浸以

熱水溫冷任意

柴胡石膏湯 治妊娠傷暑頭痛惡寒身熱躁悶四肢

疼痛項背拘急口舌乾燥

柴胡

四兩

甘草

二兩

石膏

八兩

右咬咀每服二錢水一盞姜五片煎至六分去滓溫

服若氣虛體冷加入參四兩

治妊娠熱病

葱白

五兩豆豉一升

右以水六升煮取二升分二服取汗

葵子湯 療妊娠得病六七日以上身熱入臍大小便

不利安胎除熱

葵子仁

二升滑石四兩

右以水五升煮取一升去滓取服當下便愈

葱白飲

出聖惠方

治妊娠熱病煩躁口乾小便澀赤

治妊娠熱病方

以車轄脂酒服半匕一方用水調服半匙

又方

以青羊屎水調塗腹上勿令乾

又方

以水服伏龍肝一鷄子大亦可調為泥塗臍下

治大熱煩悶方

用葛根汁二升分三服如人行五里久進一服一
方水煮葛根服勿用野葛根傷胎

又方

以燒大棗七枚為末酒和服

又方

出千金方

用槐實燒灰取方寸匕酒和服

治妊娠熱病胎死腹中下之

用烏雞一隻去毛細剉以水三升煮取二升去雞

通手用衣帛蘸摩臍下胎自出

鹿角湯 治妊娠熱病胎死腹中下之

用鹿角屑一兩水一碗葱白五莖豆豉半合同煎至六分去滓溫分二服良效一名鹿角散

治妊娠得病應服湯藥者

先搗小豆一升細篩鷄子黃和如鷺子大為二餅熟炙先令噉盡食頃乃服餘藥不爾多傷胎

治妊娠熱病

用水底泥泥心下三寸立愈

治妊娠三四月後常時熱躁忽煩悶不識人大腑熱然
後喫此方

鈎藤 桔梗 桑寄生 麥門冬 茯苓 知母

防風 各等分

右細搗羅為末每服五錢水一碗煎取八分食後去
滓喫連喫一盞亦無妨但大腑熱即可連喫也

時氣 附論

夫四時之間忽有非節之氣如春應暖而反寒夏應熱而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反暖非其節而有其氣而一氣之至無人不傷長少雖殊病皆相似者多夾應毒表也言其時普行此氣故云此時氣也妊娠遇之重者致傷胎也

方

麥門冬散 治妊娠五月至十月足患時氣五六日不得汗口乾多喫冷水熱氣上衝喘及悶亂

麥門冬

知母

茅根

各一兩

石膏

三兩

葛根

玄參

川升麻

甘草

赤芍藥

麻黃

川大黃

子芩

人參

赤茯苓

遠志

各半兩

右搗粗羅為散每服四錢水一盞入淡竹茹一分生

姜半分煎至六分去滓不計時候溫服

秦朮散

治妊婦時氣五六日不得汗口乾多喫冷水

狂語嘔逆

秦朮

柴胡

各一兩

赤茯苓

前胡

甘草

犀角

屑 家葛根 川升麻 黃芩 各半 石膏 二兩

右咬咀每服四錢水一盞姜半分淡竹茹一分煎至六分去滓無時溫服一方加人參又方敗毒散升麻葛根湯皆可用之

麻黃散 治妊娠五月或七八月卒患時氣煩熱口乾心躁頭痛四體煩疼不得安臥

麻黃 石膏 赤芍藥 甘草 葛根 黃芩

麥門冬 各一兩 柴胡 半兩

右搗篩為散每服四錢水一盞生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

遠志散 治妊娠時氣五六日未得汗口乾狂語亂見鬼神喫食不得

遠志 甘草 麻黃 各半兩 麥門冬 薯蕷 葛根

升麻 各一兩 石膏 二兩

右搗篩為散每服四錢水一盞入生薑半分煎至六分濾去滓不計時候溫服

葛根飲子 治妊婦時氣煩熱口乾頭痛

家葛根

麻黃

各半兩

石膏

一兩

豉

一合

白米

半合

梔子仁

六七枚

葱白

二莖

右細切以水二大盞煎至一盞三分去滓無時溫服以汗出為效

治妊娠時氣頭痛腰背強壯熱

升麻

青黛

前胡

梔子仁

黃芩

各二兩

石膏

八分 家葛根

三兩

右呖咀以水五升煎取二升半去滓分為三服

浮萍方 治妊娠時氣大熱令子不落護胎

浮萍 川朴硝 蛤粉 藍根

各等分

大黃

微炒

右為末水調傅臍上安胎解煩熱極妙一名護胎救生散

十全方 治妊娠患時氣

黃芩 鬱金 白朮

各一兩一分

右為末每服一大錢拔藍根少許水一中盞煎至七

分服一方地黃水下汗出效未得汗再服即瘥又妊婦患時疾用鷄卵墜并至泥隔宿取出吞之必無虞矣一方無白朮

消熱飲子 治妊婦時氣六七日熱甚大小便不利宜服此

川芒硝一兩葵子三兩

右以水二大盞煎至一盞三分去滓不計時候分溫三服以利為效

治妊娠而得時病令胎不傷

右以黃芩三兩搗末取鷄子白三枚水和煮攪之吹去沫取三升去滓令分再服不解更作佳

伏龍肝方 治妊娠時氣身大熱令子不落護胎方

用伏龍肝研令極細水調塗臍下二寸乾則易差即止亦可清泔水調服或酒調服一方取井水泥塗心下三寸乾則易

竹瀝方 治妊娠時氣未能服藥且單用

右取淡竹瀝一大盞不拘時候分為三服汗出當解
治姙娠得時氣令胎不傷方

右取鷄子以絹袋盛投井中浸令極冷敲破吞之服
六七枚至佳

治姙娠六七月感時氣煩熱口乾煩躁頭痛麻黃散主
之

麻黃

錢一

赤芍藥

柴胡

各半錢

甘草

三分半

計二錢三分半剉作二服姜三片水一盞煎八分溫

服

煩渴

附論

夫足太陰脾之經也其氣通于口手少陰心之經也其氣通于舌若妊娠之人臟腑氣虛榮衛不理陰陽隔絕熱氣乘於心脾津液枯少故令心煩而口乾也妊娠面赤口苦舌乾心煩腹脹者何蓋緣恣情飲酒因食桃李李羊鷄麩魚羶腥毒物至令百節酸痛大小便結澀可歸涼節命散

方

羚羊角散 治妊娠煩躁體熱口乾肢節疼痛少思飲

食

羚羊角屑 黃芩 麥門冬 人參 赤芍藥

木通

已上各三分

柴胡

一兩

黃耆

甘草

各半兩

右搗篩為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓不

拘時候溫服

升麻散 治妊娠煩躁熱口乾四肢疼痛喫食減少

川升麻

柴胡

各一兩

知母

三分

梔子仁

黃耆

甘

草

黃芩

麥門冬

枳殼

各半兩

右搗篩為散每服三錢水一盞入竹茹一分煎至六

分去滓不計時候溫服

赤茯苓散

治妊娠心膈氣壅滯煩躁口乾食少

赤茯苓

黃耆

柴胡

各一兩

紫蘂葉

人參

陳

橘皮

大腹皮

甘草

各半兩

前胡

三分

右搗為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓不計

時候溫服

地骨皮散 治妊娠煩躁體熱疼痛口乾食少

地骨皮 黃芩 人參 黃耆 葳蕤 麥門冬

甘草

赤芍藥

各半兩

柴胡

一兩

右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分淡竹葉二七片煎至六分去滓不計時候溫服

歸涼節命散 治妊娠恣情飲酒因食桃李果魚羊鷄

麵腥膾毒物致令百節痠疼大小便結澁面赤口苦

舌乾心煩腹脹

川芎 苧根 白芍藥 麥門冬 當歸 白朮

各一兩 糯米半合 甘草半兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時候一方有荊芥無麥門冬

黃連散 治妊娠心熱煩躁口乾舌澁多渴

黃連 瓜婁根 地骨皮 葳蕤 犀角屑 黃

芩 川升麻 甘草 各一兩

右搗篩為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠體熱煩躁口乾喫食減少宜服此方

人參 葛根 黃耆 秦艽 麥門冬 赤茯苓

已上各
一兩 知母 三分 甘草 半兩

右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分淡竹葉二七片煎至六分去滓不計時候溫服

知母飲 治妊娠口乾煩渴上焦壅熱

赤茯苓 黃芩 黃耆 各一兩半 麥門冬 一兩 知母 一兩 甘

草 一分 桑白皮 兩半

右咬咀每服四錢水一盞半竹瀝一合同煎不計時
候服

治妊娠心熱煩躁口乾舌澀多渴

梔子仁 麥門冬 黃耆 生乾地黄 各三分 秦朮

一分 甘草 一分

右搗篩為末每服三錢以水一盞煎至六分去滓不

計時候溫服

瓜蒌子散 治妊娠心煩躁熱口乾頭目不利

瓜蒌子

黃耆

枳殼

各一兩

人參

甘草

各半兩

石

膏

二兩

右搗篩為散每服三錢水一盞入竹葉二七片同煎至六分去滓不計時候溫服

治妊娠口乾煩渴上焦壅熱

黃耆

知母

地骨皮

犀角屑

嫩葛

各二錢

右咬咀每服四錢水一盞半竹瀝一合同煎不計時候服之

治妊娠心熱煩躁口乾舌澀多渴

青竹茹

一兩

麥門冬

半兩

甘草

一錢

右件藥以水一大盞煎至七分去滓不計時候分溫

二服

霍亂吐瀉

附論

夫陰陽清濁之氣相干亂於腸胃則為霍亂也但飲食

過度觸冒風冷使陰陽不和致清濁相干腸胃虛者受之故霍亂也霍亂者先吐利心腹冷痛則吐利並發有頭體疼痛熱而吐利者亦為霍亂所以然者挾風而有實故也風折乾氣皮膚緻密故血氣不得宣通致令壯熱風邪乘其經脉氣上衝頭則頭痛風氣入于腸胃則洩利胃逆則吐逆故為吐利也吐利甚者則多煩臟腑虛故也又手足逆冷陽氣暴竭謂之四逆也妊娠之病吐利甚者則傷胎也

方

白朮散

治妊娠霍亂吐瀉過多傷冷胎藏不安

白朮

白茯苓

豆蔻

陳橘皮

厚朴

各一两

芎

窮

當歸

各三分

人參

乾姜

各半两

右搗篩為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不拘

時溫服

人參散

治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參

厚朴

橘紅

各一两

當歸

乾姜

甘草

各半两

右為散每服四錢水一盞棗三箇煎至六分溫服

白朮散 治妊娠霍亂腹痛吐逆不止

白朮 益智仁 枳殼 橘紅 各三分 草豆寇 良

姜 各半兩

右為散每服三錢用水一盞半煎至六分去滓無時

溫服

蘆根飲子 治妊娠霍亂吐瀉心煩

蘆根

二兩

人參

一兩

藿香

三分

甘草

半兩

枇杷葉

片

右細剉和勻每服一錢水一盞薤白七寸生姜半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

木瓜煎 治妊娠霍亂吐瀉轉筋入腹則悶絕

吳茱萸

生姜

切各一分

木瓜

切一兩半

右細剉水二盞煎至一盞三分去滓分三服無時熱服一方有茴香一分甘草一錢茱萸半兩加紫蘇煎香茂粥 治妊娠霍亂吐瀉心煩多渴

香茂葉

生姜

人參

各半兩

右件藥以水二大盞煎取一盞三分去滓研入白米
一合煮稀粥食之

丁香散 治妊娠霍亂吐瀉煩悶

丁香 人參

各半兩

陳橘皮

三分湯浸

右搗粗羅為散以水二大盞生姜半分棗五枚煎至
一盞二分去滓分溫三服

止渴飲 治妊娠霍亂吐瀉心悶亂作渴不止

用糯米一合淘令淨細研以水一大盞研濾取汁

入蜜一合生姜汁半合相和渴即頓服立止

治妊娠霍亂吐瀉轉筋不止方

用鹽三合以水三大盞煮取二盞以青布浸拭轉筋上效

又方

右用木瓜二枚切以水五大盞煮取三盞以青布浸搗於轉筋上即定如無木瓜煎桂枝五兩亦佳

下痢

附論

夫妊娠之人胞血既閉臟氣不理脾胃易傷或恣食腥肥生冷脾胃停滯不能尅化冷熱相搏以致心腹攪刺疼痛膿血赤白雜下古書所謂滯下是也原疾之由皆因冷熱不調大腸虛冷熱客於腸間熱氣乘之則赤冷氣乘之則白冷熱相交則赤白相雜而連滯不止名為滯痢也其狀白膿如涕而有血雜亦有血少者如白膿涕而有赤脉如魚腦此名魚腦痢又有血痢者乘血入於大腸為血痢也血之隨象外行經絡內通臟腑常無

滯積若觸胃勞動生熱熱乘血散滲入大腸腸虛相化
故成血痢也凡有此證藥之苟緩恐致傷胎不可不慎
凡妊娠泄瀉冷熱不同水瀉青白或黃白或水穀不
化腹痛腸鳴其脉沉而緊此內傷冷也謂之洞泄寒中
若泄注如水深黃色及有完穀小便赤腹脇脹滿煩躁
喜飲時時嘔逆或下痢清水或小便不利得熱則極脉
虛大而數用乘虛熱入于胃湊滲下焦津液不分并於
大腸謂之協熱痢先以五苓散利小便次以黃連阿膠

九或三黃熟艾湯凡泄瀉色黃而有沫腸鳴腹脹滿微
痛其脉沉緊而小數胃之冷熱不調宜戊己丸和之凡
暴下或青或白或水穀不化腹脇或脹或不脹或痛或
不痛但餧生熟氣全不思食其脉內虛外實右關脉沉
緊者謂之飧泄先去沉積宜感應丸後調和之又治瀉
先須理中焦如理中湯丸是也次則分利水穀如五苓
散是也治中不效然後斷下即用禹餘糧赤石脂是也

方

木香散 治妊娠下痢和調脾胃保護胎氣

木香

肉豆寇

去殼

密陀僧

煨

陳橘皮

去白炒

沒藥

研

龍骨

各一分

訶梨勒

當歸

赤石脂

甘草

胡

椒

乾姜

右搗篩為散每服二錢米飲調下日三

訶梨勒湯

治妊娠下痢冷熱相攻赤白相雜日夜不

止

訶梨勒

蒼朮

肉豆寇

赤石脂

乾姜

阿

膠 白朮 艾葉 甘草 龍骨 陳皮

右為細末每服二錢以稀粥飲調下不計時候

艾葉方 治妊娠下痢

艾葉 白芷 阿膠 白朮 厚朴 黃蓮 茯苓

神 地榆皮 赤石脂 黃芩 肉豆寇

右粗搗篩每服五錢水一盞半生姜五片煎至八分

去滓溫服

治婦人欲痢輒先心痛腹脹滿日夜五六十行方

石榴皮

麴

各八錢

黃梨

烏梅

黃連

艾

各一兩

防己

二兩

阿膠

乾姜

各三兩

附子

五兩

右為末蜜和丸如梧桐子大每服二十九日三漸加

厚朴散

治妊娠臟腑氣素弱頻併下痢時時腹痛漸

覺羸瘦面色萎黃不美飲食

厚朴

白朮

川芎

白芍藥

當歸

熟地黃

乾姜

人參

訶子

甘草

右咬咀每服四錢水一盞棗三枚煎至六分溫服

黃蘗散 治妊娠下痢赤白腹中疴痛腰疼或如欲產

黃蘗 桑寄生 當歸 阿膠 赤芍藥 艾葉

芩窮 乾姜 甘草

右為散每服四錢匕以水一盞煎至六分去滓不計

時候稍熱服

白朮散 治妊娠下痢赤白腹痛日夜不止

白朮 黃芩 各一兩 赤石脂 二兩 乾姜 半兩 芩窮 三分 艾葉

人參 阿膠 當歸 各一兩

右為細散每服三錢匕粥飲調下不計時候

木香散 治妊娠下痢赤白腰腹痛胎不安

木香 地榆 黃連 艾葉 乾姜 白朮

芍藥 各三分 阿膠 當歸 各一兩

右搗篩為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不計時候稍熱服

赤石脂散 治妊娠腹痛下痢赤白日夜不止

赤石脂 阿膠 艾葉 白朮 陳橘皮 訶梨

勒各一兩 乾姜 龍骨各半兩 甘草一錢

右搗篩為散每服不計時候以粥飲調下二錢

蒙姜黃連丸 治妊娠下痢赤白不等因冷物傷脾辛酸損胃冷熱不調胎氣不安氣血凝滯下痢頻頻時有時無或赤或白腸鳴後重谷道疼痛急服蒙姜黃連丸不問冷熱二證皆可服之 若緩變成洞泄脫肛下血連臍刺痛日久死矣

乾姜 黃連 縮砂仁 芫薺 阿膠 白朮

各一

兩 乳香

三錢 枳殼 半兩

右為細末用鹽梅三個取肉入少醋糊同杵勻和如
梧子大每服四十九白痢乾姜湯下赤痢甘草湯下
赤白痢乾姜甘草湯下並不拘時候一方有訶子一
兩龍骨半兩無砂仁阿膠枳殼

黃連湯

大全良方

療妊娠腹痛下痢膿血不止

黃連

八分

厚朴

阿膠

當歸

各六分

艾葉

黃蘗

各四分

乾姜

五分

右為細末空心米飲下方寸匕日三服

健脾湯 治妊娠下痢臍腹撮痛益胃氣進飲食

厚朴

蒼朮

各四兩

陳橘皮

三兩

大棗

一升

白茯苓

二兩

半人參

二兩

甘草

三兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生姜三片棗三枚
劈碎同煎至六分去滓溫服此藥能進食調脾胃

乾姜散 治妊娠下痢

乾姜

細辛

桂

附子

各一兩

椒目

猪苓

各半兩

小麥麴

一兩

右為末散每服方寸匕溫酒調下

姜連散 治胎前下痢

訶梨勒 龍骨 乳香 乾姜 芫薺 白朮

鹽梅

各等分

右為細末入梅肉攪勻如膏漸漸丸梧桐子大每服五七丸白痢白姜湯下五九赤痢甘草湯下赤白痢白姜甘草湯下忌生冷毒物一方有黃連

厚朴散 治妊娠下痢日夜頻併臍腹撮痛

厚朴

三兩

吳茱萸

三兩

甘草

懷香子

乾姜

陳橘

皮

各一兩

右為細散每服二錢匕煎紫木瓜湯調下食前服

白豆寇湯 治妊娠下血腹痛腸鳴

白豆寇

陳橘皮

桂

去粗皮

訶梨勒

當歸

各二兩

枳殼

半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生姜五片棗二枚劈同

煎至七分去滓稍熱服如要丸用好棗漿水煮去皮
核細研和丸如梧桐子大以生姜拍碎炒黑色入水
煎湯下十五丸

石榴皮散 治妊娠下痢赤白痢利腹痛不可忍

酸石榴皮

三分

阿膠

一分

地榆皮

黃蘗

一分

苦窮

三分

當

歸

一兩

右為細散每服三錢匕薤白粥飲調下不計時候一
方用葱白粥調服

厚朴散 治妊娠水穀痢

厚朴 白茯苓 訶梨勒 黃連 乾姜 木

香 各半
兩

右搗篩為散每服四錢水一盞入棗三枚煎至六分
去滓不計時候稍熱服

治妊娠下痢

人參 黃芩 酸石榴皮 各三兩
樗皮 四兩
粳米 三合

右咬咀以水七升煮取二升半分三服

治妊娠患膿血赤滯魚腦白滯臍腹絞痛不可忍者

薤白

升切一

酸石榴皮

黃蘗

兩各三

阿膠

兩二

地榆

兩四

右咬咀以水七升煮取二升半分三服不瘥更作一

方無薤白

療妊娠下痢赤白腹痛不可忍

黃連

石榴皮

當歸

兩各三

阿膠

錢二

熟艾

半一兩

右用水六升煮取二升溫分三服忌生冷肥膩

薤白飲子 療妊娠下痢赤白腹痛不食

薤白

合切一

當歸

地榆

各一兩

甘草

半兩

糯米

合一

右為散以水七升煮取二升去滓溫分三服

肉豆寇散

治妊娠下痢不可療者及丈夫脾虛滯瀉

肉豆寇

十枚大者去殼用白麵作麵餅子裏文武火煨

木香

一兩草豆寇

十枚

去皮白麵裏煨

訶梨勒

二十枚

甘草

一兩蜜炙

右為細散每服二錢匕米飲調下食前服

阿膠丸

治妊娠下痢日夜頻併安胎氣止腹痛

阿膠

酸石榴皮

各半兩

黃連

一兩

當歸

肉豆寇

各三

分

右為末煉蜜九如赤小豆大水飲下十五丸食前服
阿膠散 治妊娠下痢赤白腹痛不止

阿膠

當歸

各一兩

白朮

三分

艾葉

酸石榴皮

各半兩

右搗篩為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不計
時候稍熱服

療妊娠下痢不止

黃蘗

乾姜

赤石脂

各二兩

酸石榴皮

二枚

右細切以水八升煮取二升分三服

阿膠丸 治妊娠下痢膿血不止腹中疝痛

阿膠

二兩

白朮

五兩

黃連

肉豆蔻仁

各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前溫

米飲下

治妊娠及產已寒熱下痢

黃連

一升

黃蘗

一升

梔子

二十枚

右咬咀以水五升漬宿煮三沸服一升一日一夜令

盡嘔者加橘皮一兩生姜二兩亦治丈夫常痢一方
治中暑挾熱下痢無梔子仁用姜羊脂煎服

療妊娠白膿痢腹中冷痛

乾姜

四兩

赤石脂 粳米

右用水七升煮取二升分溫三服忌生冷肥膩

療妊娠痢黃水不絕

厚朴 黃連 肉豆寇

右用水二升煮取一升頓服忌如前

療妊娠下痢赤白心腹痛小便澀

糯米 當歸 黃耆

右細切和調以水二盞煮取二分去滓溫分四服

大寧散 治妊娠下痢赤白及泄瀉疼痛垂死者

黑豆 甘草 米殼

右為粗末都作一服入生姜三片同煎食前服

治妊婦下痢膿血及咳嗽膿血名白朮湯

白朮 黃芩 當歸

右為末每服三錢水煎去滓食前服加桑白皮止嗽
玉粉丹 治妊娠下痢赤白裏急後重努嘔脫肛腸解
膿血魚腦或因傷寒後餘毒滲入腸間撮痛絞痛

石燕 真輕粉 玄胡索

右為細末以鷄子為丸如梧桐子大米飲下三丸若
不服藥日深子母俱殞其產後并年高氣血虛極老
人皆可服如小兒只一九效

神捷散 治妊娠下痢及水瀉不止米穀不消化者

菖蒲 赤石脂 各一兩 乾姜 半兩

右搗羅為散空心米飲調下二錢匕日三

黃連湯 治妊娠下痢頻併後重裏急

黃連 黃蘗 各三兩 白朮 四兩

右粗篩每服五錢匕水一盞半生姜三片煎至八分

去滓溫服日三

黃連散 治妊娠熱痢腹痛煩悶

黃連 梔子仁 當歸

右細剉分為三服每服水一盞煎至六分去滓不計時候分溫三服

療妊娠臍下刺痛大便血晝夜三五十行

根黃 大蒜

右以根黃為末研蒜作膏為丸如梧桐子大空心粥飲下三十九日三服一方不用根黃用當歸以芍藥煎湯吞下

鷄黃散

出三方

療妊娠下痢赤白絞刺疼痛

烏鷄子

一枚就頭上開一穴傾去清只留黃

黃丹

二錢用鷄子殼內打令勻裹以黃泥

固濟煨取乾為細末

右每服二錢米飲調下一服愈者是男二服愈者是

女胎前後冷熱痢方無毒者皆可擇用

厚朴丸

出大全良方

治妊娠洞泄寒中

乾姜

厚朴

去粗皮細剉

右等分先杵令爛水拌同炒令乾再為末水煮麵糊

為丸如桐子大每服五十九食前米飲下

治姙娠下痢

肘後方

用白楊皮一觔咬咀以水一大斗煮取二升分三

服

又方

用燒中衣帶三寸為末服之

又方

右羊脂如碁子大十枚溫酒一升投中頓服三日

治姙娠臨產下痢

以梔子不拘多少燒存性為細末每服一大杯空心熱水調服甚者連進四五服即止

狐灰散 治妊娠下痢極甚者不過三五服見效

用野狐腸連心肺須臘月收於罐子內以文武火燒取黑灰不得令過火候有青烟出便塞卻竅子勿令透氣候冷取為細末每服二錢米飲調下極甚者一日三服大效三日內頓安如是尋常痢或疼痛立愈

治妊娠下痢日夜不止方

用烏梅二兩軟者竹串慢火炙令乾焦為細散食
前陳米飲調下二錢匕如瀉血加黃連一兩為末
治妊娠下痢方

用敗龜一枚用米醋炙搗羅為散米飲調下二錢
食前服

縮胎散 治妊娠下痢赤白心腹疼痛小便澀方

枳殼二錢 香附子二兩 甘草一兩半

右為末孕婦未產前日常服如茶點之能縮胎生產
絕易須百沸湯點服

鴛粟湯 治婦人妊娠痢疾裏急後重百藥不效

鴛粟殼 甘草 烏梅

右等分咬咀白水煎服立效

療妊娠血痢

以阿膠二兩以酒一升半煮取一升頓服

大小便秘澀

附論

夫妊娠大小便不通者由臟腑氣實而生於熱熱者隨停之處則成病也若熱結於大腸則大便不通結於小腸則小便不通若大小腸為熱所結故煩滿而大小便皆不通也又云小腸有熱熱入於內脬熱結甚者令小便不通則心脇小腹氣澁而喘急也陳無則云胎滿逼脬多致小便不利者或心腎氣不足不能使脬冷清澁相干為諸淋病致小便不通名曰轉胞又胎滿尿出不時名曰遺尿治之各有方

方

檳榔散 治姙娠大小便不通心腹脹滿妨悶不欲飲

食手足煩熱

檳榔 赤茯苓 大腹皮 木通 郁李仁 北

五味

各一兩

桑寄生

甘草

苦桔梗

各一兩

右為粗末每服三錢水一盞煎至六分溫服一方無

五味子

歸涼節命散 治姙娠恣情飲酒或食生果魚羊鷄麵

毒物致令百節痠疼大小腑秘澁面赤口苦心煩腹

脹

方見本門
煩渴類

梔子湯 治妊娠大小便不通臍腹脹痛

梔子仁

一兩半

石膏

四兩

黃芩

一兩半

澤瀉

二兩

芎藭

一兩半

赤芍藥

二兩

姜豉

一兩半

車前草

切半兩

右粗搗篩每服四錢匕水一盞半淡竹葉十片同煎

至八分去滓食前服

芎胡通塞湯 治妊娠大小便不通下焦熱結

芑胡 黃芩 陳橘皮 澤瀉 羚羊角 各三錢 梔

子仁 一兩 石膏 一兩 大黃 剉炒 一兩

右粗搗篩每服四錢匕水一盞入生地黃一分拍破
豉半分炒同煎至七分去滓食前溫服

治妊娠大小便不通熱閉心膈腹脇妨悶妨害飲食

大黃 木通 檳榔 各一兩 枳殼 三錢 大腹皮 二枚 訶梨

勒 四個半 生半煨

右為末以童子小便一盞葱白二寸同煎至六分調

下二錢不拘時候

車前子湯 治妊娠大小便俱不通

車前子

五兩

木通

四兩

黃芩

二兩

郁李仁

二兩半

大黃

二兩

右粗搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去滓食

前溫服

大腹皮散 治妊娠大小便秘澁浮腫

枳殼 大腹皮 甘草 赤茯苓

右為細末每服二錢濃煎葱白湯下不拘時候

冬葵根湯 治妊娠大小便不通七八日以上腹脹脅悶

冬葵根 車前草 木通 大黃

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食前溫服

茅根湯 治妊娠大小便不通結悶氣急脹滿欲死

茅根 滑石 車前子 大黃

右粗搗篩每服四錢水一盞半煎至八分去滓食前

溫服

木通湯 治妊娠大小便不通下部脹滿坐臥不安

木通 滑石 大麻仁 大黃

右粗搗篩每服四錢水一盞半煎至七分去滓空心溫服

白榆皮湯 治妊娠大小便不通

白榆皮 桂 甘草 滑石

右粗搗篩每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前

溫服

冬葵子湯 治妊娠大小便不通

冬葵子 大黃

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食前溫服

冬葵根汁方 治妊娠大小便不通

生冬葵根

生姜

各搗汁

右和令勻分三服空心日一服未利再服又未利盡

三服

治妊娠小便不通臍下妨悶虛羸大便秘

車前子 大黃

右為細末每服三錢空心蜜調下

葵子湯 治妊娠得病六七日以上身熱入臍大小便不利安胎除熱

治婦人雙身大小便不利

用八正散大作劑料去滑石加葵菜子煎服經日

膀胱不利為癰者小便閉而不通也如八正散加木香取效更捷經曰膀胱氣化則能出焉然後五苓散三五服則愈也

治妊娠大小便不通

用豬脂如半鷄子大碎切以酒半升煖令沸投豬膏內更煎一兩沸分三服食前溫服未通再服

治妊娠大小便不利方

用甘遂煨令黃搗細羅為散每服不計時候以水

調下

治大小便赤澀

大腹皮

枳殼

甘草

各一錢

赤茯苓

三錢

剉作三服水一盞半煎一盞將郁李仁二錢半去皮尖同煎五七沸空心連服通為度如不通必是大腑熱秘宜服後方

枳殼

一錢

大黃

二錢

甘草

一錢

三味為細末作三服濃煎葱白湯調下雖通小便復

澁脹煩熱不得睡臥而反倚息心胞絛戾不得溺者
病名轉胞可服八味丸

治妊娠大腑秘熱非時腰痛行履不得方

杏仁 桔梗 升麻 枳殼 前胡

各一分

大腹皮

一兩

右為細末每服二錢水一盞二分煎三四沸食後臨
臥徐徐去滓服

治妊娠小便不利大腑熱小便時水道中疼痛不可勝

忍方

葶藶子 麥門冬 知母 柴胡 茯苓 川芎

升麻 枳殼 杏仁 各一分 冬葵子 三銖

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎取九分食後臨臥去滓吃大腑熱服後方

麥門冬 升麻 大黃 杏仁 各一分 大腹皮 一兩

右細杵羅為末每服三錢水一盞二分煎取一盞食後臨臥徐徐去滓吃

治妊娠通身搔痒漸次面目渾身四肢俱腫心躁不安
大小腑秘熱宜服此方吃此藥了小便通盡平復如
故更不須吃後面方若上餘分數小便未通即吃後
面通小腸方

黃芩 山梔 杏仁 前胡 升麻 知母 桔

梗 大黃 枳殼 葶藶

各等分

右細杵羅為末每十錢水一盞葱白三枝同煎四五
沸瀉出去滓溫和食後喫

普濟方卷三百四十